



Zmena odberového materiálu na vyšetrenie krvných skupín a skríningu nepravidelných protilátok u gravidných

Z dôvodu zmeny metodiky vyšetrovania v imunohematológii musíme typ odberového materiálu – krv je potrebné odoberať do EDTA skúmaviek (ako na krvný obraz). Skúmavky so zrazenou krvou (ako na sérologické vyšetrenie) nebudeme môcť akceptovať po 1.5.2010.

Odberový materiál: EDTA skúmavka

Imunohematologické vyšetrenia je možné vykonávať len z primárnej skúmavky (samostatný odber), na vyšetrenie nie je možné prijať prelievané skúmavky.

Minimálny objem odobratej krvi: 2 ml (u detí prijmeme aj skúmavku s menším objemom krvi, nemôžeme však zaručiť, že bude v skúmavke dostatočný objem plazmy, napr. pri vysokom hematokrite)

Označenie skúmavky: priezvisko, meno, rodné číslo

Vyšetrenie krvnej skupiny pozostáva

1. z určenia krvnej skupiny AB0 pomocou monoklonálnych diagnostických sér anti-A a anti-B a vyšetrenia aglutinínov anti-A a anti-B s testovacími erytrocytmi A1 a B,
2. vyšetrenia Rh (D) skupiny dvomi rôznymi diagnostickými sérami a
3. zo skríningu nepravidelných protilátok proti antigénom erytrocytov nepriamym antiglobulínovým testom (NAT).

Pozitivita skríningu nepravidelných protilátok: Pozitivitu skríningu nepravidelných protilátok proti antigénom erytrocytov pri vyšetrení krvnej skupiny alebo pri skríningu nepravidelných protilátok u gravidných žien je nutné doriešiť špecifikáciou protilátok.

Do špecializovaného imunohematologického laboratória, napr. do Národnej transfúznej služby SR, v rajóne (NTS) treba odoslať 2 skúmavky zrazenej krvi bez gélu a 1 EDTA skúmavku. Je nevyhnutné udať anamnestické údaje ako bolo uvedené vyššie.

Upozornenie: Výsledky vyšetrenie krvnej skupiny nie je možné telefonicky hlásiť, ale môžeme Vám po validácii výsledku (vyšetrenia a skontrolovania) vytlačiť výsledok z počítača na ktoromkoľvek pracovisku Medirex, a.s. alebo Vám výsledok môžeme zaslať faxom, prípadne odovzdať osobne.