MEDIREX

Vypĺňať paličkovým písmom tmavým perom.

na **hematologické** vyšetrenie

ŽIADANKA H 0 0 0 3

Miesto na nalepenie čiarového kódu.

člen MEDIREX GROUP
všetko pre vaše zdravie

Údaje o pacientovi

Rodné číslo, resp. číslo poistenca

Meno

Priezvisko

Pohlavie muž ☐ žena ☐

U cudzincov Kód krajiny EU

Identif. číslo pacienta

Kód dg.

Kód poisťovne pacienta

Dátum odberu

d d . m m . r r

Čas odberu

:

Kód poskytovateľa

Kód odosielajúceho lekára

Tel.

Pečiatka lekára:

☐ Sťažený odber	☐ Kapilárny odber	**Materiál**	☐ Krv	☐ Dialyzát	☐ Pleur. punkt.	☐ Ascites	☐ Náter kostnej drene	☐ Iné

Pri koagulačnom vyšetrení vyznačte liečbu ovplyvňujúcu koaguláciu:

Názov lieku:

Dávkovanie:

- ☐ p.o. antikoagulačná liečba
- ☐ nízkomolekulárny heparín
- ☐ nefrakcionovaný heparín
- ☐ trombolytická liečba
- ☐ iná antitrombotická liečba
- ☐ iné lieky ovplyvňujúce koaguláciu

Krvný obraz +	**Hemokoagulácia ***	**Iné špeciálne koagulačné vyšetrenia ****
☐ Krvný obraz+diferenciál	☐ PT - %	☐ Faktor II - F II
☐ Retikulocyty	☐ PT - INR	☐ Faktor V - F V
☐ ApEo	☐ APTT - R	☐ Faktor VII - F VII
☐ Tr v TromboExact	☐ Fibrinogén - Fbg	☐ Faktor VIII - F VIII
☐ Tr v citráte	☐ Trombínový čas -TT	☐ Faktor IX - F IX
Špeciálne vyšetrenia +	☐ D - Dimér	☐ Faktor X - F X
☐ Morfológia Ery	☐ Antitrombín III - AT III	☐ Faktor XI - F XI
☐ Morfológia Tr	**Testy na trombofilné stavy ****	☐ Faktor XII - F XII
☐ ALP v Leu	☐ ProC Global	☐ Anti-Xa
☐ Siderocyty	☐ ProC Global - F V	☐ Retrakcia plazmatického koagula ***
☐ Sideroblasty	☐ Protein C - PC	☐ Etanol gelifikačný test - EGT
Osmotická rezistencia erytrocytov ++	☐ Protein S - PS	☐
☐	☐ Plazminogén - PLG	**Testy na LA - Lupus antikoagulans ****
Imunohematológia	☐ Antitrombín III - AT III	☐ PTČ - LA
☐ Krvná skupina	☐ Faktor VIII - F VIII	☐ LA1
☐ Skríning anti-Ery protilátok - NAT	☐ PTČ - LA	☐ LA2
☐ Priamy antiglobulínový test - PAT	☐ LA1	☐ Korekčný test 1:1
☐	☐ LA2	☐ Korekčný test 4:1
☐	☐ Alfa-2-antiplazmín - A2AP	☐
☐	☐ Faktor XIII - FXIII	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

Medirex, a.s., člen **MEDIREX** GROUP
laboratórna diagnostika ■ Galvaniho 17/C ■ 821 04 Bratislava
tel.: 0850 00 30 30 ■ +421 2 208 29 350
centralnelaboratorium@medirex.sk ■ www.medirex.sk ■ www.medirexgroup.sk

©Medirex, a.s.

Aktualizácia: 31. 10. 2011

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Typ odberu:
+ odber do K-EDTA
++ do čistej skúmavky 2 kvapky heparínu + 2 ml krvi
* odber do citrátu
** aspoň 9 ml krvi do citrátu
*** samostatná skúmavka 5 ml krvi do citrátu

Upozornenie: Na vyšetrenie krvného obrazu a koagulačného vyšetrenia je nutné dodržať správne množstvo odobratej krvi do skúmaviek (naplniť skúmavku po rysku), prípustná zmena objemu je ± 10% naplnenosti skúmavky.